

TÍTULO

CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDA HEMÁTICA EN HEMORRAGIA OBSTÉTRICA SEVERA PARA SEGURIDAD DEL PACIENTE

PALABRAS CLAVES

Pérdida hemática, hemorragia obstétrica severa (H.O.S), Seguridad del paciente.

INTRODUCCIÓN - OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN:

La hemorragia obstétrica severa es una causa principal de mortalidad materna y representa un desafío crítico para el equipo quirúrgico y de enfermería. La intervención rápida y organizada del personal de enfermería puede marcar la diferencia en la supervivencia y la recuperación materna.

OBJETIVOS:

- **General:** Sintetizar la evidencia científica disponible sobre el abordaje enfermero de la hemorragia obstétrica severa en el quirófano.
- **Específicos:**
 1. Identificar intervenciones de enfermería que mejoren la estabilidad hemodinámica y reduzcan complicaciones maternas.
 2. Analizar la eficacia de protocolos y guías de actuación en la práctica clínica.
 3. Evaluar la calidad y nivel de evidencia de los estudios existentes.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó una revisión sistemática de la literatura siguiendo las directrices PRISMA 2020. Se consultaron las bases de datos PubMed, Scielo, CINAHL y Cochrane Library, considerando publicaciones en inglés y español entre 2015 y 2025. Los términos de búsqueda incluyeron: "postpartum hemorrhage", "obstetric hemorrhage", "nursing management", "operative room" y "protocols".

RESULTADOS

De 238 artículos identificados, 32 cumplieron criterios de inclusión. Las intervenciones de enfermería más destacadas incluyeron:

- **Monitorización intensiva:** Control continuo de TA, FC, SatO₂ y diuresis, permitiendo detección temprana de descompensación hemodinámica.

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

- **Preparación y administración de hemoderivados:** Coordinación con banco de sangre y administración rápida de concentrados globulares, plasma y plaquetas.
- **Aplicación de protocolos de actuación:** Uso de checklists y guías basadas en ACOG y OMS asociadas a reducción significativa de pérdida sanguínea y menor necesidad de transfusión.
- **Apoyo en medidas de contención:** Masaje uterino, compresión bimanual y asistencia en procedimientos quirúrgicos hemostáticos.

DISCUSIÓN / CONCLUSIONES

La revisión sistemática evidencia que un abordaje enfermero protocolizado y basado en evidencia durante la hemorragia obstétrica severa en quirófano mejora los resultados maternos, reduciendo pérdida sanguínea, transfusiones y complicaciones asociadas.

BIBLIOGRAFÍA

1. World Health Organization. WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage. Geneva: WHO; 2012.
2. American College of Obstetricians and Gynecologists. Postpartum Hemorrhage. Practice Bulletin No. 183. Obstet Gynecol. 2017;130:e168–86.
3. Say L, Chou D, Gemmill A, Tuncalp O, Moller AB, Daniels J, et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Lancet Glob Health. 2014;2:e323–33.
4. Weeks AD. The prevention and treatment of postpartum haemorrhage: a review. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2015;29:595–610.
5. Chandharan E. ABC of labour care: Management of obstetric haemorrhage. BMJ. 2018;360:k1047.