

VALORACIÓN INICIAL EXTRAHOSPITALARIA : ESTABILIZACIÓN DEL ARMA BLANCA



VALORACIÓN INICIAL EXTRAHOSPITALARIA : ESTABILIZACIÓN DEL ARMA BLANCA


- La patología Traumática Grave se considera un problema de salud pública a nivel mundial.
 - ✓ Problema complejo y multidisciplinar.
 - ✓ **14.000** muertes diarias.
 - ✓ Una de las **5** causas principales de muerte.
 - ✓ La herida por **arma blanca** es la causa principal de T. Penetrante.
 - ✓ Patología **Tiempo-Dependiente**



VALORACIÓN INICIAL EXTRAHOSPITALARIA : ESTABILIZACIÓN DEL ARMA BLANCA

PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO DE ATENCIÓN AL TRAUMA GRAVE

- Unificación de criterios evitando la variabilidad individual.
- Aumento de la calidad asistencial con mejores resultados en cuanto a morbimortalidad.
- Aumento de la satisfacción de profesionales y usuarios.



VALORACIÓN INICIAL EXTRAHOSPITALARIA : ESTABILIZACIÓN DEL ARMA BLANCA



VALORACIÓN INICIAL EXTRAHOSPITALARIA : ESTABILIZACIÓN DEL ARMA BLANCA

TRAUMA SCORE REVISED (TRS)

- A nivel prehospitalario, herramienta de **triaje** más utilizada.
- Determina la activación del Código Trauma por **CRITERIOS FISIOLÓGICOS**.
- La afectación de GCS sería indicación de Código trauma.
- **CRITERIOS ANATÓMICOS**: Lesiones penetrantes en cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades proximales al codo o rodilla.

- Trauma Score Revisado (TSR) ≤ 11 .



GCS	PAS	FR	PUNTOS
13-15	>89	10-29	4
9-12	76-89	>29	3
6-8	50-75	6-9	2
4-5	1-49	1-5	1
3	0	0	0



VALORACIÓN INICIAL EXTRAHOSPITALARIA : ESTABILIZACIÓN DEL ARMA BLANCA

EFAST

- Herramienta prehospitalaria.
- Valoración y diagnóstico de lesiones que precisan intervención inmediata:
Taponamiento Cardíaco
- No demorar traslado.



VALORACIÓN INICIAL EXTRAHOSPITALARIA : ESTABILIZACIÓN DEL ARMA BLANCA

- No disponemos de un protocolo extrahospitalario para la estabilización del arma blanca.
- La práctica más común es la inmovilización con cinta adhesiva (esparadrapo) a criterio del profesional.
- La movilización del arma conlleva el riesgo de aumento de lesiones potencialmente mortales.
- La manipulación del arma blanca destruye/contamina posibles pruebas forenses.



VALORACIÓN INICIAL EXTRAHOSPITALARIA : ESTABILIZACIÓN DEL ARMA BLANCA

- El entorno prehospitalario presenta una dificultad per se para la estabilización/conservación del arma blanca.
- El paciente es movilizado irremediablemente.
- Necesidad de un procedimiento estandarizado..



VALORACIÓN INICIAL EXTRAHOSPITALARIA : ESTABILIZACIÓN DEL ARMA BLANCA

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO MLuq

- Plan de actuación estandarizado aplicable a la asistencia prehospitalaria.
- Engloba calidad asistencial junto con preservación de pruebas forenses.



VALORACIÓN INICIAL EXTRAHOSPITALARIA : ESTABILIZACIÓN DEL ARMA BLANCA

Conclusiones

- ✓ Asistencia integrada a todos los niveles
- ✓ Dificultades específicas de la asistencia prehospitalaria
- ✓ IMPORTANCIA PROTOCOLO Mluq



